

## Cape/Tr 療法レジメン

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tr   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cape | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |

### 【投与量】

| 一般名（略語）      | 投与量  |            |
|--------------|--|------------|
| トラスツズマブ（Tr）  | 初回：8mg/kg、2回目以降：6mg/kg                         |            |
| カペシタビン（Cape） | $BSA < 1.33 \text{ m}^2$                       | 3000mg/day |
|              | $1.33 \text{ m}^2 \leq BSA < 1.57 \text{ m}^2$ | 3600mg/day |
|              | $1.57 \text{ m}^2 \leq BSA < 1.81 \text{ m}^2$ | 4200mg/day |
|              | $1.81 \text{ m}^2 \leq BSA <$                  | 4800mg/day |

カペシタビンは1日2回内服

### 【投与方法】

|   |                                  |       |                       |
|---|----------------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | 生食 50mL                          | ルート確保 |                       |
| 2 | 生食 250mL<br>トラスツズマブ 6 または 8mg/kg | 点滴静注  | 初回：90分<br>2回目以降：30分以上 |