

キイトルーダ[®] (200) /PTX 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembro	●	(●)																			
PTX	●							●													

1 コース目は day2 に Pembro 投与

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
ペムブロリズマブ (Pembro)	200mg
パクリタキセル (PTX)	90mg/m ²

【投与方法】

Day 1	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
	2	生食 100mL ペムブロリズマブ 200mg	点滴静注	30 分
	3	生食 50mL	点滴静注	
	ジフェンヒドラミン(10) 5T 内服			
	4	生食 50mL ファモチジン 1A デキサメタゾン 8. 25mg~1. 65mg	点滴静注	5 分
	30 分あける			
Day 8	5	生食 250m L パクリタキセル 90mg/m ²	点滴静注	60 分
	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
	ジフェンヒドラミン(10) 5T 内服			
	2	生食 50mL ファモチジン 1A デキサメタゾン 4. 95~1. 65mg	点滴静注	5 分
30 分あける				
	3	生食 250m L パクリタキセル 90mg/m ²	点滴静注	60 分