

1 コース目) Pembro (200) /PTX/CBDCA 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembro		●																			
PTX	●							●							●						
CBDCA		●																			

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
ペムブロリズマブ (Pembro)	200mg
パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²
カルボプラチン (CBDCA)	AUC5

【投与方法】

Day 1	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
		ジフェンヒドラミン(10) 5T	内服	
	2	生食 50mL / ファモチジン 1A / デキサメタゾン 8.25mg	点滴静注	5分
	30分あける			
Day 2	3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分
	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
	2	生食 100mL ペムブロリズマブ 200mg	点滴静注	30分
	3	生食 50mL	点滴静注	
	4	生食 250mL ホスアプレピタント 1V	点滴静注	30分
	5	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30分
Day 8	6	生食 250mL カルボプラチン AUC5	点滴静注	30分
	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
		ジフェンヒドラミン(10) 5T	内服	
	2	生食 50mL / ファモチジン 1A / デキサメタゾン 4.95mg	点滴静注	5分
	30分あける			
	3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分

Day 15	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
		ジフェンヒドラミン(10) 5T	内服	
	2	生食 50mL / ファモチジン 1A / デキサート 3.3mg	点滴静注	5分
	30分あける			
	3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分

2 コース目) Pembro (200) /PTX /CBDCA 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembro	●																				
PTX	●							●							●						
CBDCA	●																				

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
ペムブロリズマブ (Pembro)	200mg
パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²
カルボプラチン (CBDCA)	AUC5

【投与方法】

	No.	内容	投与方法	時間
Day 1	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
	2	生食 100mL ペムブロリズマブ 200mg	点滴静注	30分
	3	生食 50mL	点滴静注	
	4	生食 250mL ホスアプレピタント 1V	点滴静注	30分
		ジフェンヒドラミン(10) 5T	内服	
	5	グラニセトロン 100mL / ファモチジン 1A / デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30分
	6	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分
	7	生食 250mL カルボプラチン AUC5	点滴静注	30分
Day 8, 15	7	生食 50mL	点滴静注	
	1	生食 100mL	点滴静注	ルート
		ジフェンヒドラミン (10) 5T	内服	
	2	生食 50mL / ファモチジン 1A / デキサメタゾン 1.65mg	点滴静注	5分
	30分あける			
3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分	