

Pembro (400) /GEM/CBDCA 療法レジメン

	1	~	7	8	~	14	15	~	21	22	~	28	29	~	35	36	~	42
Pembro	●																	
GEM	●			●						●			●					
CBDCA	●			●						●			●					

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ペムブロリズマブ（Pembro）	400mg
ゲムシタビン（GEM）	1,000mg/m ²
カルボプラチン（CBDCA）	AUC 2

【投与方法】

Day 1	1	生食 250mL	点滴静注	ルート
	2	生食 100mL ペムブロリズマブ 400mg	点滴静注	30分
	3	生食 50mL	点滴静注	
	4	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
	5	生食 100mL ゲムシタビン 1000mg/m ²	点滴静注	30分
	6	生食 250mL カルボプラチン AUC 2	点滴静注	90分
Day 8・22・29	1	生食 250mL	点滴静注	ルート
	2	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
	3	生食 100mL ゲムシタビン 1000mg/m ²	点滴静注	30分
	4	生食 250mL カルボプラチン AUC 2	点滴静注	90分