

XELOX 療法レジメン

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| L-OHP | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cape | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |

【投与量】

| 一般名（略語） | 投与量 | |
|-----------------|---|------------------|
| オキサリプラチン(L-OHP) | 130mg/m ² | |
| カペシタビン (Cape) | BSA < 1.36 m ² | 2400mg/day (分 2) |
| | 1.36 m ² ≤ BSA < 1.66 m ² | 3000mg/day (分 2) |
| | 1.66 m ² ≤ BSA < 1.96 m ² | 3600mg/day (分 2) |
| | 1.96 m ² ≤ BSA | 4200mg/day (分 2) |

* Cape は Day 1 夕～開始

【投与方法】

| | | | |
|---|--|------|-----|
| 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 100mL | 点滴静注 | |
| 2 | パロノセトロン注(0.75mg) 50mL デキサメタゾン 9.9mg | 点滴静注 | 30分 |
| 3 | 5%ブドウ糖液 500mL オキサリプラチン 130mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 |