

## XELOX/Tr 療法レジメン

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tr    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| L-OHP | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cape  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |

### 【投与量】

| 一般名（略語）          | 投与量                                             |                  |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| トラスツズマブ (Tr)     | 初回：8mg/kg<br>2回目以降：6mg/kg                       |                  |
| オキサリプラチン (L-OHP) | 130mg/m <sup>2</sup>                            |                  |
| カペシタビン (Cape)    | BSA < 1.36 m <sup>2</sup>                       | 2400mg/day (分 2) |
|                  | 1.36 m <sup>2</sup> ≤ BSA < 1.66 m <sup>2</sup> | 3000mg/day (分 2) |
|                  | 1.66 m <sup>2</sup> ≤ BSA < 1.96 m <sup>2</sup> | 3600mg/day (分 2) |
|                  | 1.96 m <sup>2</sup> ≤ BSA                       | 4200mg/day (分 2) |

\* Cape は day1 タ～開始

### 【投与方法】

|   |                                                |      |                       |
|---|------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | ルート用<br>生食 100mL                               | 点滴静注 |                       |
| 2 | 生食 250mL<br>トラスツズマブ 6 または 8mg/kg               | 点滴静注 | 初回：90分<br>2回目以降：30分以上 |
| 3 | パロノセトロン注 (0.75mg) 50mL<br>デキサメタゾン 9.9mg        | 点滴静注 | 30分                   |
| 4 | 5%ブドウ糖液 500mL<br>オキサリプラチン 130mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 2時間                   |