

## XP/Tr (short hydration) 療法レジメン

day \	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Cape	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
CDDP	●																					
Tr	●																					

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量	
カペシタビン（Cape）	$BSA < 1.36 \text{ m}^2$	2400mg/day
	$1.36 \text{ m}^2 \leq BSA < 1.66 \text{ m}^2$	3000mg/day
	$1.66 \text{ m}^2 \leq BSA < 1.96 \text{ m}^2$	3600mg/day
	$1.96 \text{ m}^2 \leq BSA$	4200mg/day
シスプラチン（CDDP）	80mg/m <sup>2</sup>	
トラスツズマブ（Tr）	初回：8mg/kg、2回目以降 6mg/kg	

### 【投与方法】

1	生食 500mL	点滴静注	ルート用
2	生食 250mL トラスツズマブ 6 または 8mg/kg	点滴静注	初回 90分 2回目以降 30分以上
3	パロノセトロン注 (0.75mg) 50mL ホスネツピタント 1V デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
4	生食 500mL シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間
5	生食 50mL フロセミド(20mg) 1A	点滴静注	15分
6	ソルアセット F 500mL	点滴静注	2時間