

CapeOX/ゾルベツキシマブ（初回）療法レジメン

★ カペシタビンが治療に含まれます。処方があるか確認してください。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ZOL	●																				
L-OHP	●																				
Cape	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

【投与量】

一般名（略語）	投与量	
ゾルベツキシマブ（ZOL）	800mg/m ²	
オキサリプラチン（L-OHP）	130mg/m ²	
カペシタビン	BSA < 1.36 m ²	2400mg/day（分 2）
	1.36 m ² ≤ BSA < 1.66 m ²	3000mg/day（分 2）
	1.66 m ² ≤ BSA < 1.96 m ²	3600mg/day（分 2）
	1.96 m ² ≤ BSA	4200mg/day（分 2）

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	パロノセトロン注 50mL ホスネツピタント 1V デキサメタゾン 9.9mg d-クロルフェニラミン注 1A ファモチジン注 1A	点滴静注	30分
3	生食 100mL	点滴静注	全開
4	<u>フィルター使用（オキサリプラチンと別ルートで）</u> ビロイ 800mg/m ² （2mg/mL 溶液） ＊すぐ使用しない場合は冷所保存 ＊投与開始後 6 時間以内に投与完了する	点滴静注	!
5	5% TZ 500mL オキサリプラチン 130mg/m ²	点滴 静注	2 時間

! 70mL/h(30分) → 100mL/h(30分) → 150mL/h(30分) → 200mL/h(30分) → 250mL/h

Cape0X/ゾルベツキシマブ（2回目以降）療法レジメン

★ カペシタビンが治療に含まれます。処方があるか確認してください。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ZOL	●																				
L-OHP	●																				
Cape	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

【投与量】

一般名（略語）	投与量	
ゾルベツキシマブ（ZOL）	600mg/m ²	
オキサリプラチン（L-OHP）	130mg/m ²	
カペシタビン	BSA < 1.36 m ²	2400mg/day（分 2）
	1.36 m ² ≤ BSA < 1.66 m ²	3000mg/day（分 2）
	1.66 m ² ≤ BSA < 1.96 m ²	3600mg/day（分 2）
	1.96 m ² ≤ BSA	4200mg/day（分 2）

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	パロノセトロン注 50mL ホスネツピタント 1V デキサメタゾン 9.9mg d-クロルフェニラミン注 1A ファモチジン注 1A	点滴静注	30分
3	生食 100mL	点滴静注	全開
4	<u>フィルター使用（オキサリプラチンと別ルートで）</u> ビロイ 600mg/m ² （2mg/mL 溶液） *すぐ使用しない場合は冷所保存 *投与開始後 6 時間以内に投与完了する	点滴静注	!
5	5% TZ 500mL オキサリプラチン 130mg/m ²	点滴 静注	2 時間

! 50mL/h (30分) → 75mL/h (30分) → 100mL/h (30分) → 150mL/h (30分) → 200mL/h