

FOLF0X6/ゾルベツキシマブ療法レジメン（初回）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZOL	●													
L-OHP	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ゾルベツキシマブ（ZOL）	800mg/m ²
オキサリプラチン（L-OHP）	85mg/m ²
レボホリナート Ca（I-LV）	200mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	400mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	2400mg/m ²

【投与方法】

1	生食 250mL	ルート用	
2	パロノセトロン注 50mL ホスネツピタント 1V デキサメタゾン注 9.9mg d-クロルフェニラミン注 1A ファモチジン注 1A	点滴静注	30 分
3	<u>フィルター使用</u> ゾルベツキシマブ 800mg/m ² （2mg/mL 溶液）	点滴静注	！
4	生食 100mL	点滴静注	
5	5% TZ 250mL オキサリプラチン 85mg/m ²	生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注 2 時間
6	生食 50m L 5FU 400mg/m ²	点滴静注	全開
7	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする	インフューザー 46 時間	

！ 70mL/h(30 分)→100mL/h(30 分)→150mL/h(30 分)→200mL/h（30 分）→250mL/h

FOLF0X6/ゾルベツキシマブ療法レジメン（2回目以降）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZOL	●													
L-OHP	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ゾルベツキシマブ（ZOL）	400mg/m ²
オキサリプラチン（L-OHP）	85mg/m ²
レボホリナート Ca（I-LV）	200mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	400mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	2400mg/m ²

【投与方法】

1	生食 250mL	ルート用	
2	パロノセトロン注 50mL ホスネツピタント 1V デキサメタゾン注 9.9mg d-クロルフェニラミン注 1A ファモチジン注 1A	点滴静注	30 分
3	<u>フィルター使用</u> ゾルベツキシマブ 400mg/m ² （2mg/mL 溶液）	点滴静注	！
4	生食 100mL	点滴静注	
5	5% TZ 250mL オキサリプラチン 85mg/m ²	生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注 2 時間
6	生食 50mL 5FU 400mg/m ²		全開
7	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする		

！ 35mL/h(30 分) → 50mL/h(30 分) → 70mL/h(30 分) → 100mL/h