

## BV/TAS-102 療法レジメン

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	BV	•														•														
	TAS-102	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																	

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量	
ベバシズマブ（BV）	5mg/kg	
トリフルリジン・チピラシル（TAS-102）	体表面積（m <sup>2</sup> ）	初回基準量
	1.07 未満	35mg/回（70mg/日）
	1.07～1.23 未満	40mg/回（80mg/日）
	1.23～1.38 未満	45mg/回（90mg/日）
	1.38～1.53 未満	50mg/回（100mg/日）
	1.53～1.69 未満	55mg/回（110mg/日）
	1.69～1.84 未満	60mg/回（120mg/日）
	1.84～1.99 未満	65mg/回（130mg/日）
	1.99～2.15 未満	70mg/回（140mg/日）
	2.15 以上	75mg/回（150mg/日）

\* TAS-102 は Day1 夕～開始

### 【投与方法】

1	ルート用 生食 50mL	点滴静注	
2	生食 100mL ベバシズマブ 5mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分