

BV/mFOLF0X6 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bev	●													
L-OHP	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ベバシズマブ（BV）	5mg/kg
オキサリプラチン（L-OHP）	85mg/m ²
レボホリナート Ca（I-LV）	200mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	400mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	2400mg/m ²

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL ベバシズマブ 5mg/kg	点滴静注	初回：90 分 2 回目：60 分 3 回目以降：30 分
3	パロノセトロン注（0.75mg） 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30 分
4	5%ブドウ糖液 250mL オキサリプラチン 85mg/m ²	点滴静注	2 時間
4	生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注	2 時間
5	生食 50mL 5FU 400mg/m ²	静注	全開
6	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする	インフューザー 46 時間	

＊ オキサリプラチンとレボホリナートは同時滴下