

Cetuximab/FOLFOX6 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cet	●													
L-OHP	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
セツキシマブ (Cet)	500mg/m ²
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ²
レボホリナート Ca (-LV)	200mg/m ²
フルオロウラシル (5FU)	400mg/m ²
フルオロウラシル (5FU)	2400mg/m ²

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL デキサメタゾン 9.9mg クロルフェニラミン 1A	点滴静注	30分
3	生食 500mL セツキシマブ 500mg/m ²	点滴静注	2時間
4	生食 100mL	点滴静注	ルートフラッシュ
5	パロノセトロン注 50mL	点滴静注	30分
6	5% 250mL オキサリプラチン 85mg/m ²	生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注 2時間
7	生食 50mL 5FU 400mg/m ²	点滴静注	全開
8	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする	点滴静注	インフューザー 46時間