

Cetuximab/Encorafenib レジメン

	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	27	28
Cet	●				●				●				●				
encorafenib	●	●	...	●	●	●	...	●	●	●	...	●	●	●	...	●	●

【投与量】

一般名（略語）	投与量
セツキシマブ（Cet）	初回：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²
エンコラフェニブ（－）	300mg/day

【投与方法】

	ジフェンヒドラミン（10） 5T	内服	
1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30分
3	生食 250mL セツキシマブ 400mg/m ² （初回） 200mg/m ² （2回目以降）	点滴静注	初回：2時間 2回目以降：1時間
4	生食 100mL	点滴静注	* 初回のみ Cet 投与後 1時間経過観察

(2週毎) Cetuximab/Encorafenib レジメン

	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	27	28
Get	●								●								
encorafenib	●	●	...	●	●	●	...	●	●	●	...	●	●	●	...	●	●

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
セツキシマブ (Get)	500mg/m ²
エンコラフェニブ (-)	300mg/day

【投与方法】

	ジフェンヒドラミン (10) 5T	内服	
1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30分
3	生食 250mL セツキシマブ 500mg/m ²	点滴静注	2時間
4	生食 100mL	点滴静注	* 初回のみ Get 投与後 1時間経過観察