

## FOLFOXIRI 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	●													
CPT-11	●													
I-LV	●													
5FU(infusor)	⇒													

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
オキサリプラチン（L-OHP）	85mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン（CPT-11）	150mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート Ca（/-LV）	200mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル（5FU）	2400mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL ホスアプレピタント（150mg） 1A	点滴静注	30分
3	パロノセトロン注（0.75mg） 50mL ホスネツピタント（235mg） 1V デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
5	生食 250mL イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
6	5%ブドウ糖液 250mL オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間
6	5%ブドウ糖液 250mL レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間
7	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> 生食を加えて全量 96mL とする	インフューザー 48時間	

\* オキサリプラチンとレボホリナートは同時滴下