

Pmab/FOLFIRI 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pmab	●													
CPT	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名（略語）	投与量
パニツムマブ（Pmab）	6mg/kg
イリノテカン（CPT-11）	150mg/m ²
レボホリナート Ca（I-LV）	200mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	400mg/m ²
フルオロウラシル（5FU）	2400mg/m ²

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL パニツムマブ 6mg/kg	点滴静注	60分
3	パロノセトロン注(0.75mg) 50mL ホスネツピタント (235mg) 1V デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
4	生食 250mL イリノテカン 150mg/m ²	点滴静注	2時間
4	生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注	2時間
5	生食 50mL 5FU 400mg/m ²	点滴静注	全開
6	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする	インフューザー 46時間	

* イリノテカンとレボホリナートは同時滴下