

## Pmab/mFOLF0X6 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pmab	●													
L-OHP	●													
I-LV	●													
5FU (bolus)	●													
5FU (infusor)	⇒													

### 【投与量】

一般名(略語)	投与量
パニツムマブ (Pmab)	6mg/kg
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート Ca(I-LV)	200mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル (5FU)	400mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル (5FU)	2400mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL パニツムマブ 6mg/kg	点滴静注	60 分
3	パロノセトロン注(0.75mg) 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30 分
4	5%ブドウ糖液 250mL オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2 時間
4	生食 250mL レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2 時間
5	生食 50mL 5FU 400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開
6	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> 生食を加えて全量 92mL とする	インフューザー 46 時間	

\* オキサリプラチンとレボホリナートは同時滴下