

## XELIRI 療法レジメン

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	CPT	●																					
	Cape	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量	
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m <sup>2</sup>	
カペシタビン (Cape)	BSA < 1.31 m <sup>2</sup>	1800mg/day (分 2)
	1.31 m <sup>2</sup> ≤ BSA < 1.69 m <sup>2</sup>	2400mg/day (分 2)
	1.69 m <sup>2</sup> ≤ BSA < 2.07 m <sup>2</sup>	3000mg/day (分 2)
	2.07 m <sup>2</sup> ≤ BSA	3600mg/day (分 2)

\* カペジタビン day1 タ～開始

### 【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL ベバシズマブ 7.5mg/kg	点滴静注	90 分
3	パロノセトロン注(0.75mg) 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30 分
4	生食 500mL イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90 分