

ziv-aflibercept/FOLFIRI 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ziv-aflibercept	●													
CPT	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名（略語）	投与量
アフリベルセプト (ziv-aflibercept)	4mg/kg
イリノテカン (CPT)	150mg/m ²
レボホリナート Ca(/-LV)	200mg/m ²
フルオロウラシル (5FU)	400mg/m ²
フルオロウラシル (5FU)	2400mg/m ²

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 100mL アフリベルセプト 4mg/kg	点滴静注	60分
3	パロノセトロン注(0.75mg) 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
4	生食 250mL イリノテカン 150mg/m ²	点滴静注	2時間
4	生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注	2時間
5	生食 50mL 5FU 400mg/m ²	点滴静注	全開
6	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする	インフューザー 46時間	

* イリノテカンとレボホリナートは同時滴下