

FOLFIRINOX 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	●													
CPT	●													
I-LV	●													
5FU(bolus)	●													
5FU(infusor)	⇒													

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ²
イリノテカン (CPT-11)	180mg/m ²
レボホリナート Ca (-LV)	200mg/m ²
フルオロウラシル (5FU)	400mg/m ²
フルオロウラシル (5FU)	2400mg/m ²

【投与方法】

1	生食 100mL	ルート用	
2	パロノセトロン注(0.75mg) 50mL ホスネツピタント(235mg) 1V デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
3	5%ブドウ糖液 250mL オキサリプラチン 85mg/m ²	点滴静注	2時間
4	(点滴静注 2時間) 生食 250mL レボホリナート 200mg/m ²	点滴静注	
	(点滴静注 90分) 生食 250mL イリノテカン 180mg/m ²		
5	生食 50mL 5FU 400mg/m ²	静注	全開
6	5FU 2400mg/m ² 生食を加えて全量 92mL とする	インフューザー 46時間	