

## アテゾリズマブ/CBDCA/nab-PTX 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ATEZO	●																				
CBDCA	●																				
Nab-PTX	●							●							●						

アテゾリズマブ/CBDCA/nab-PTX 療法を 4~6 コース施行し、その後アテゾリズマブ単剤を行う

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
アテゾリズマブ（ATEZO）	1200mg
カルボプラチン（CBDCA）	AUC 6
パクリタキセル（nab-PTX）	100mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

Day	No.	投与内容	投与方法	投与時間
Day 1	1	生食 250mL	点滴静注	
	2	生食 250mL アテゾリズマブ 1200mg	点滴静注	初回 60分 2回目以降 30分
	3	生食 100mL	点滴静注	15分
	4	パロノセトロン 50mL ホスネツピタント（235mg） 1V デキサート 6.6mg	点滴静注	30分
	5	生食 100mL Nab-パクリタキセル 100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
	6	生食 250mL パラプラチン AUC6	点滴静注	60分
Day 8, 15	1	生食 100mL	点滴静注	
	2	生食 100mL デキサート 6.6mg	点滴静注	30分
	3	生食 100mL Nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分

## アテゾリズマブ 維持療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ATEZO	●																					

**【投与量】**

一般名（略語）	投与量
アテゾリズマブ（ATEZO）	1200mg

**【投与方法】**

1	生食 100mL	点滴静注	
2	<u>フィルター使用</u> 生食 250mL テセントリク 1200mg	点滴静注	30分
3	生食 100mL	点滴静注	