

## ニボルマブ療法レジメン

〈2 週毎〉

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| day   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ニボルマブ | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

【投与量】

|         |       |
|---------|-------|
| 一般名（略語） | 投与量   |
| ニボルマブ（） | 240mg |

【投与方法】

|   |                         |      |        |
|---|-------------------------|------|--------|
| 1 | ルート用<br>生食 100mL        | 点滴静注 |        |
| 2 | 生食 100mL<br>ニボルマブ 240mg | 点滴静注 | 30 分以上 |
| 3 | 生食 50mL                 | 点滴静注 |        |

〈4 週毎〉

|       |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |
|-------|---|---|-----|---|---|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| day   | 1 | 2 | ... | 7 | 8 | 9 | ... | 14 | 15 | 16 | ... | 21 | 22 | 23 | ... | 28 |
| ニボルマブ | ● |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |

【投与量】

|         |       |
|---------|-------|
| 一般名（略語） | 投与量   |
| ニボルマブ（） | 480mg |

【投与方法】

|   |                         |      |        |
|---|-------------------------|------|--------|
| 1 | ルート用<br>生食 100mL        | 点滴静注 |        |
| 2 | 生食 100mL<br>ニボルマブ 480mg | 点滴静注 | 30 分以上 |
| 3 | 生食 50mL                 | 点滴静注 |        |