

ペムブロリズマブ療法レジメン

〈3 週毎〉

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ペムブロリズマブ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与量】

| | |
|------------|-------|
| 一般名（略語） | 投与量 |
| ペムブロリズマブ（） | 200mg |

【投与方法】

| | | | |
|---|----------------------------|------|------|
| 1 | 生食 100mL | 点滴静注 | ルート |
| 2 | 生食 100mL ペムブロリズマブ 200mg | 点滴静注 | 30 分 |
| 3 | 生食 50mL | 点滴静注 | |

〈6 週毎〉

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | day | 1 | ... | 7 | 8 | ... | 14 | 15 | ... | 21 | 22 | ... | 28 | 29 | ... | 35 | 36 | ... | 42 |
| ペムブロリズマブ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与量】

| | |
|------------|-------|
| 一般名（略語） | 投与量 |
| ペムブロリズマブ（） | 400mg |

【投与方法】

| | | | |
|---|----------------------------|------|------|
| 1 | 生食 100mL | 点滴静注 | ルート |
| 2 | 生食 100mL ペムブロリズマブ 400mg | 点滴静注 | 30 分 |
| 3 | 生食 50mL | 点滴静注 | |