

皮下注 DBd 療法レジメン（1 サイクル目（1～3 週目））

1 サイクル 21 日間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Daratumumab	●							●							●						
Bortezomib	●			●				●			●										
DEX	●	●		●	●			●	●		●	●			●						

※ベルケイドは最低 72 時間空けて投与する事

【投与量】

一般名（略語）	投与量	備考欄
ダラツムマブ（DARA）	15mL /Body	Infusion reaction 注意
ボルテゾミブ（BOR）	1. 3mg /m ²	3mg あたり生食 1.2mL で溶解(2.5mg /mL)
デキサメタゾン（DEX）	20mg /Body	※適宜減量される場合あり

【投与方法】

《Day1, 8 に内服するもの》				
●アセトアミノフェン 650～1000mg 1 日 1 回				
●レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 1 日 1 回				
●モンテルカスト錠 10mg 1錠 1 日 1 回				
DARA 投与開始の 1～3 時間前に内服				
Day1, 8	1	生食 100mL	点滴静注	ルート確保用（最後に全開で滴下）
	2	生食 100mL カイトリル 1mg デキサート6.6mg ×3 本	点滴静注	30 分で滴下
	3	ダラツムマブ 15 mL	皮下注 (手動注入)	Infusion reaction 注意
	4	ボルテゾミブ _____mg	皮下注	
Day4, 11	●カイトリル錠 1mg 1錠 ●レナデックス錠 4mg 5錠		内服	30 分前
	1	ボルテゾミブ _____mg	皮下注	

《Day15 に内服するもの》			
●アセトアミノフェン 650～1000mg 1 日 1 回			
●レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 1 日 1 回			
●レナデックス錠（4mg） 5錠 1 日 1 回			
DARA 投与開始の 1～3 時間前に内服			
Day15	ダラツムマブ 15 mL	皮下注 (手動注入)	Infusion reaction 注意

皮下注 DBd 療法レジメン（2・3サイクル目（4～9 週目））

1 サイクル 21 日間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Daratumumab	●							●							●						
Bortezomib	●			●				●			●										
DEX	●	●		●	●			●	●		●	●			●						

※ベルケイドは最低 72 時間空けて投与する事

【投与量】

一般名（略語）	投与量	備考欄
ダラツムマブ（DARA）	15mL /Body	Infusion reaction 注意
ボルテゾミブ（BOR）	1. 3mg /m ²	3mg あたり生食 1.2mL で溶解 (2.5mg /mL)
デキサメタゾン（DEX）	20mg /Body	※適宜減量される場合あり

【投与方法】

《Day1、Day8 に内服するもの》 ●アセトアミノフェン 650～1000mg 1 日 1 回 ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1 日 1 回 ●カイトリル錠 1mg 1錠 1 日 1 回 ●レナデックス錠 4mg 5錠 1 日 1 回				DARA 投与開始の 1～3 時間前に内服	
Day1・8	1	ダラツムマブ <u>15</u> mL	皮下注 (手動注入)	Infusion reaction 注意	
	2	ボルテゾミブ _____ mg	皮下注		
Day4・11	●カイトリル錠 1mg 1錠 ●レナデックス錠 4mg 5錠		内服	30 分前	
	1	ボルテゾミブ _____ mg	皮下注		

《Day15 に内服するもの》 ●アセトアミノフェン 650～1000mg 1 日 1 回 ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1 日 1 回 ●レナデックス錠（4mg） 5錠 1 日 1 回				DARA 投与開始の 1～3 時間前に内服	
Day1		ダラキューロ <u>15</u> mL	皮下注 (手動注入)	Infusion reaction 注意	

皮下注 DBd 療法レジメン（4～8 サイクル目（10～24 週目））

1 サイクル 21 日間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Daratumumab	●																				
Bortezomib	●			●				●			●										
DEX	●	●		●	●			●	●		●	●									

※ベルケイドは最低 72 時間空けて投与する事

【投与量】

一般名（略語）	投与量	備考欄
ダラツムマブ（DARA）	15mL /Body	Infusion reaction 注意
ボルテゾミブ（BOR）	1. 3mg /m ²	3mg あたり生食 1.2mL で溶（2.5mg /mL）
デキサメタゾン（DEX）	20mg /Body	※適宜減量される場合あり

【投与方法】

《Day1 に内服するもの》 ●アセトアミノフェン 650～1000mg 1 日 1 回 ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1 日 1 回 ●カイトリル錠 1mg 1錠 1 日 1 回 ●レナデックス錠 4mg 5錠 1 日 1 回 DARA 投与開始の 1～3 時間前に内服				
Day1	1	ダラツムマブ <u>15</u> mL	皮下注 (手動注入)	Infusion reaction 注意
	2	ボルテゾミブ _____ mg	皮下注	
Day4・8・11		●カイトリル錠 1mg 1錠 ●レナデックス錠 4mg 5錠	内服	30 分前
	1	ボルテゾミブ _____ mg	皮下注	

皮下注 DBd 療法レジメン（9 サイクル以降（25 週目以降））

1 サイクル 28 日間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Daratumumab	●																											
DEX	●																											

【投与量】

一般名（略語）	投与量	備考欄
ダラツムマブ（DARA）	15m L /Body	Infusion reaction 注意
デキサメタゾン（DEX）	20m g /Body	

【投与方法】

●アセトアミノフェン 650～1000mg 1 日 1 回 ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5 錠</u> 1 日 1 回 ダラキューロ投与開始の 1～3 時間前に内服 ●レナデックス錠（4mg） <u>5 錠</u> 1 日 1 回			
Day1	ダラツムマブ <u>15</u> mL	皮下注 (手動注入)	Infusion reaction 注意