

DKd (DCd) 療法レジメン (1 サイクル目) : **ダラツムマブは皮下注**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1サイクル28日間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Daratumumab | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | |
| Carfilzomib | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| DEX | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | |

【投与量】

| 一般名 (略語) | 投与量 | 備考欄 |
|----------------|---|----------------------|
| ダラツムマブ (DARA) | 15 mL/Body | Infusion reaction 注意 |
| カルフィルゾミブ (CAR) | 56mg/m ² ※MAX123.2mg/body まで (1 サイクル目の Day1・2のみ 20mg/m ²) | ※MAX44mg/body まで) |
| デキサメタゾン (DEX) | 20mg/Body (Day22のみ 40mg/Body) | ※適宜減量される場合あり |

【投与方法】

| | | | |
|---|------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●レナデックス錠 4mg 5錠 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 ダラキューロ投与開始の1~3時間前 ●レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 1日1回 (Infusion reactionの予防) ●モンテルカスト錠 10mg 1錠 1日1回 | | | |
| Day1 | ダラツムマブ <u>15</u> mL | | 皮下注 Infusion reaction 注意 |
| | 1 | 生食 500mL | 点滴静注 腫瘍崩壊症候群予防のhydration |
| | 2 | ルート用 5%ブドウ糖液 500mL | 点滴静注 |
| | 3 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | 点滴静注 Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day2 | ●レナデックス錠 4mg 5錠 | | 内服 |
| | 1 | 生食 500mL | 点滴静注 腫瘍崩壊症候群予防のhydration |
| | 2 | ルート用 5%ブドウ糖液 500mL | 点滴静注 |
| | 3 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィブゾミブ _____mg | 点滴静注 Infusion reaction 注意 30分で滴下 |

| | | | | |
|---------|---|--|--------------------------------|---|
| Day8・15 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) | | | |
| | ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 <u>ダラキューロ投与開始の1~3時間前</u> | | | |
| | ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1日1回 (Infusion reactionの予防) | | | |
| | ダラツムマブ <u>15</u> mL | 皮下注 | Infusion reaction 注意 | |
| 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 500mL | 点滴静注 | カiproリスの 投与終了後は2時間で滴下 | |
| 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィブソミブ _____mg | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 | |
| Day9・16 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> | | 内服 | 76歳以上ではD9・16のレナデックスは <u>2錠(8mg)</u> へ減量 |
| | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 500mL | 点滴静注 | カiproリスの 投与終了後は2時間で滴下 |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィブソミブ _____mg | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day22 | ●レナデックス錠 4mg <u>10錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) (※76歳以上の患者では5錠(20mg)への減量) | | | |
| | ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 <u>ダラキューロ投与開始の1~3時間前</u> | | | |
| | ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1日1回 (Infusion reactionの予防) | | | |
| | ダラツムマブ <u>15</u> mL | 皮下注 | Infusion reaction 注意 | |

DKd (DCd) 療法レジメン (2 サイクル目) : **ダラツムマブは皮下注**

| 1 サイクル28日間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Daratumumab | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| Carfilzomib | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| DEX | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |

【投与方法】

| | | | |
|---------|--|--|--|
| Day1 | ●レナデックス錠 4mg 5錠 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 ダラキューロ投与開始の1~3時間前 ●レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 1日1回 (Infusion reaction の予防) | | |
| | ダラツムマブ | 1.5 mL | 皮下注 Infusion reaction 注意 |
| Day1 | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | 点滴静注 |
| | 2 | フィルター使用 5%ブドウ糖注 50mL (※50mL 抜く) カルフィルゾミブ _____mg | 点滴静注 Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day2 | ●レナデックス錠 4mg 5錠 76歳以上ではD2のレナデックスは無し | | |
| | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | 点滴静注 |
| | 2 | フィルター使用 5%ブドウ糖注 50mL (※50mL 抜く) カルフィルゾミブ _____mg | 点滴静注 Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day8・15 | ●レナデックス錠 4mg 5錠 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 ダラキューロ投与開始の1~3時間前 ●レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 1日1回 (Infusion reaction の予防) | | |
| | ダラツムマブ | 1.5 mL | 皮下注 Infusion reaction 注意 |
| Day8・15 | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | 点滴静注 |
| | 2 | フィルター使用 5%ブドウ糖注 50mL (※50mL 抜く) カルフィルゾミブ _____mg | 点滴静注 Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day9・16 | ●レナデックス錠 4mg 5錠 76歳以上ではD9・16のレナデックスは無し | | |
| | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | 点滴静注 カiproリスの 投与終了後は1時間で滴下 |

| | | | | |
|-------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 50mL (※50mL 抜く) カルフィルゾミブ _____mg | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day22 | <ul style="list-style-type: none"> ●レナデックス錠 4mg <u>10錠</u> 1日1回 (※76歳以上の患者では5錠(20mg)への減量) ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 <u>ダラキュー</u>投与開始の1~3時間前 ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1日1回 (Infusion reactionの予防) | | | |
| | | ダラツムマブ _____1.5_____mL | 皮下注 (手動注入) | Infusion reaction 注意 |

DKd (DCd) 療法レジメン (3~6 サイクル目): **ダラツムマブは皮下注**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1サイクル28日間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Daratumumab | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| Carfilzomib | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| DEX | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | |

【投与方法】

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|---|
| Day1 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) | | | | |
| | ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 ダラキューロ投与開始の1~3時間前 | | | | |
| | ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1日1回 (Infusion reaction の予防) | | | | |
| | ダラツムマブ <u>15</u> mL | | 皮下注 | Infusion reaction 注意 | |
| 1 | 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | ルート用 | |
| 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 | |
| Day2 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> | | | | |
| | 内服 | | 76歳以上ではD2のレナデックスは無し | | |
| | 1 | 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | ルート用 |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day8・9 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> | | | | |
| | 内服 | | 76歳以上ではD8のレナデックスは <u>3錠</u> 76歳以上ではD9のレナデックスは <u>2錠</u> | | |
| | 1 | 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | ルート用 |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 (Irritant drug) |
| Day15 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) | | | | |
| | ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 ダラキューロ投与開始の1~3時間前 | | | | |
| ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1日1回 (Infusion reaction の予防) | | | | | |
| ダラツムマブ <u>15</u> mL | | 皮下注 | Infusion reaction 注意 | | |
| Day15 | 1 | 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | ルート用 |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 |

| | | | | |
|-------|--|--|------|--------------------------------|
| Day16 | ●レナデックス錠4mg <u>5錠</u> | | 内服 | 76歳以上の患者ではD16のレナデックスは無し |
| | 1 | 5%ブドウ糖液 250mL | 点滴静注 | ルート用 |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 |
| Day22 | ●レナデックス錠4mg <u>10錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) (※76歳以上の患者では5錠(20mg)への減量) | | | |

DKd (DCd) 療法レジメン (7 サイクル以降): **ダラツムマブは皮下注**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 サイクル28日間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Daratumumab | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carfilzomib | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| DEX | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |

【投与方法】

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------|--------------------------------|--|--|
| Day 1 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) | | | | | |
| | ●アセトアミノフェン 650~1000mg 1日1回 ダラキューロ投与開始の1~3時間前 | | | | | |
| | ●レスタミンコーワ錠 10mg <u>5錠</u> 1日1回 (Infusion reaction の予防) | | | | | |
| | ダラツムマブ <u>1.5</u> mL | | 皮下注 (手動注入) | Infusion reaction 注意 | | |
| 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | カiproリスの 投与終了後は1時間で滴下 | | |
| 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 | | |
| Day 2 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> | | | 内服 | 76歳以上の患者ではD2のレナデックスは無し | |
| | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | | |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カルフィルゾミブ _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 | |
| Day 8・9・15・16 | ●レナデックス錠 4mg <u>5錠</u> | | | 内服 | ※76歳以上ではD8・15のレナデックスは <u>3錠</u> ※76歳以上ではD9・16のレナデックスは <u>2錠</u> | |
| | 1 | ルート用 5%ブドウ糖液 250mL | | 点滴静注 | カiproリスの 投与終了後は1時間で滴下 | |
| | 2 | <u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 <u>50mL (※50mL 抜く)</u> カiproリス _____mg | | 点滴静注 | Infusion reaction 注意 30分で滴下 | |
| Day 22 | ●レナデックス錠 4mg <u>10錠</u> 1日1回 (レナデックスは多発性骨髄腫の治療薬) (※76歳以上の患者では5錠 (20mg) への減量) | | | | | |