

## G-CHOP 療法レジメン（1サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
G		●							●							●					
CPA	●																				
ADM	●																				
VCR	●																				
PSL	●	●	●	●	●																

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
オビヌツズマブ（G）	1000mg/Body
シクロホスファミド（CPA）	750mg/m <sup>2</sup>
ドキシソルビシン（ADM）	50mg/m <sup>2</sup>
ビンクリスチン（VCR）	1.4mg/m <sup>2</sup>
プレドニゾン（PSL）	60mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

Day 1			
1	ルート用 生食 250mL	点滴静注	
2	グラニセトロン 100mL	点滴静注	30分
3	生食 100mL ドキシソルビシン 50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分
4	生食 20mL ビンクリスチン 1.4mg/m <sup>2</sup> (max: 2mg/body)	静注	ゆっくり1分程度
5	生食 100mL シクロホスファミド 750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
Day1 朝から PSL 内服			
Day2, 9, 16			
	アセトアミノフェン(500) 1T、d-カルボエニラミンマリン(2) 1T、 ラフチジン(10) 1T	内服	G投与の30分以上前 内服確認
1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 50mL デキサート 6.6mg	点滴静注	G投与開始30分前 Day9, 16のみ
3	生食 200mL オビヌツズマブ 1000 mg	点滴静注	指示どおり

## G-CHOP 療法レジメン（2～6 サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
G		●																			
CPA	●																				
ADM	●																				
VCR	●																				
PSL	●	●	●	●	●																

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
オビヌツズマブ（G）	1000mg/Body
シクロホスファミド（CPA）	750mg/m <sup>2</sup>
ドキソルビシン（ADM）	50mg/m <sup>2</sup>
ビンクリスチン（VCR）	1.4mg/m <sup>2</sup>
プレドニゾロン（PSL）	60mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

Day 1			
1	ルート用 生食 250mL	点滴静注	
2	グラニセトロン 100mL	点滴静注	30 分
3	生食 100mL ドキソルビシン 50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15 分
4	生食 20mL ビンクリスチン 1.4mg/m <sup>2</sup> (max: 2mg/body)	静注	ゆっくり 1 分程度
5	生食 100mL シクロホスファミド 750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30 分
Day1 朝から PSL 内服			
Day2,			
	アセトアミノフェン(500) 1T、d-カルボエラミン(2) 1T、 ラフチジン(10) 1T	内服	G 投与の 30 分以上前 内服確認
1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 200mL オビヌツズマブ 1000 mg	点滴静注	指示どおり

## G-CHOP 療法レジメン（7、8 サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
G	●																					

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
オビヌツズマブ（G）	1000mg/Body

### 【投与方法】

	アセトアミノフェン(500) 1T、d-ケルフェミンマリン(2) 1T、ラフチジン(10) 1T	内服	G投与の30分以上前 内服確認
1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 200mL オビヌツズマブ 1000 mg	点滴静注	指示どおり