

点滴静注 IsaPd 療法レジメン（1 サイクル目）

1 サイクル 28 日間	第 1 週目							第 2 週目							第 3 週目							第 4 週目						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ISA	●							●							●							●						
POM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
DEX	●							●							●							●						

【投与量】

商品名	一般名（略語）	投与量	備考欄
サークリサ	イサツキシマブ（ISA）	10mg/kg	Infusion reaction 注意
ポマリスト	ポマリドミド（POM）	4mg /Body（Day1～21） ※適宜減量される場合あり	
デキサート注	デキサメタゾン（DEX）	40mg /Body ※75 歳以上の患者は 20mg に減量。	

【投与方法】

Day1・8・15・22	1	生食 250mL	点滴静注	ルート確保用
	2	生食 100mL ポララミン注 5mg 1 管 ファモチジン注 20mg 1 管 デキサート注 6.6mg <u>6管</u> （75 歳以上は <u>3管↑</u> ）	点滴静注	1 の側管から投与 15 分で滴下
	3	アセリオ静注液 70mL <u>（30mL 抜く）</u>	点滴静注	15 分で滴下
	4	生食 100mL	点滴静注	15 分で滴下
	5	<u>フィルター使用</u> 生食 250mL サークリサ _____mg	点滴静注 （輸液ポンプ）	Infusion reaction 注意 滴下速度注意。（*）

*《Day1 の投与速度》

[サークリサ 400mg /日以下の時] 100mL/hr(1 時間)→140mL/hr(30 分)→以降は 170mL/hr

[サークリサ 401～600mg /日の時]

70mL/hr(1 時間)→90mL/hr(30 分)→110mL/hr(30 分)→以降は 130mL/hr

[サークリサ 601～800mg /日の時]

55mL/hr(1 時間)→70mL/hr(30 分)→80mL/hr(30 分)→100mL/hr(30 分)→以降は 110mL/hr

《Day8・15・22 の投与速度》

[サークリサ 400mg /日以下の時] 100mL/hr(1 時間)→以降は 170mL/hr で最後まで

[サークリサ 401～600mg /日の時]

70mL/hr(1 時間)→110mL/hr(30 分)→以降は 150mL/hr で最後まで

[サークリサ 601～800mg /日の時]

55mL/hr(1 時間)→80mL/hr(30 分)→110mL/hr(30 分)→以降は 125mL/hr で最後まで

点滴静注 IsaPd 療法レジメン（2サイクル目以降）

1 サイクル 28 日間	第 1 週目							第 2 週目							第 3 週目							第 4 週目						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ISA	●														●													
POM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
DEX	●							●							●							●						

【投与方法】

Day 1・15	1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	ルート確保用
	2	生食 100mL ボラミン注 5mg 1 管 ファモチジン注 20mg 1 管 デキサート注 6.6mg <u>6 管</u> （75 歳以上は <u>3 管↑</u> ）	点滴静注	1 の側管から投与 15 分で滴下
	3	アセリオ静注液 70mL <u>(30mL 抜く)</u>	点滴静注	15 分で滴下
	4	生食 100mL	点滴静注	15 分で滴下
	5	<u>フィルター使用</u> 生食 250mL サークリサ _____mg	点滴静注 (輸液ポンプ)	Infusion reaction 注意 滴下速度注意。(*)
[サークリサ 400mg/日以下の時] 100mL/hr(1 時間)→以降は 170mL/hr で最後まで [サークリサ 401～600mg/日の時] 70mL/hr(1 時間)→110mL/hr(30 分)→以降は 150mL/hr で最後まで [サークリサ 601～800mg/日の時] 55mL/hr(1 時間)→80mL/hr(30 分)→110mL/hr(30 分)→以降は 125mL/hr で最後まで				

もしもサークリサ投与中に Grade2 以上の Infusion reaction が認められた場合は Grade1 以下に回復するまで休薬すること。回復後、開始速度の半分の速度で再開することができる。Infusion reaction の再発がなければ、30 分毎に 15mL/h r ずつ投与速度を上げることが出来る。

《Day 8、Day 22 に内服するもの》	
●レナデックス錠（4mg）	1 日 1 回 <u>10 錠</u> （※75 歳以上の患者は 5 錠）