

点滴静注 Isa+d 療法レジメン（1 サイクル目）

| 1 サイクル 28 日間 | 第 1 週目 | | | | | | | 第 2 週目 | | | | | | | 第 3 週目 | | | | | | | 第 4 週目 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ISA | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| DEX | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |

【投与量】

| 一般名（略語） | 投与量 | 備考欄 |
|--------------|----------------|------------------------|
| イサツキシマブ（ISA） | <u>20mg/kg</u> | Infusion reaction 注意 |
| デキサメタゾン（DEX） | 40m g /Body | ※75 歳以上の患者は 20m g に減量。 |

【投与方法】

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------|--|
| Day 1・8・15・22 | 1 | ルート用 生食 100mL | 点滴静注 | ルート確保用 |
| | 2 | 生食 100mL ポララミン注 5mg 1 管 ファモチジン注 20mg 1 管 デキサート注 6.6mg <u>6 管</u> （75 歳以上は <u>3 管↑</u> ） | 点滴静注 | 15 分で滴下 |
| | 3 | アセリオ静注液 70mL <u>（30mL 抜く）</u> | 点滴静注 | 15 分で滴下 |
| | 4 | 生食 100mL | 点滴静注 | 15 分で滴下 |
| | 5 | <u>フィルター使用</u> 生食 250mL サークリサ _____mg | 点滴静注 （輸液ポンプ） | Infusion reaction 注意 滴下速度注意。 （詳細は下記速度指示参照） |

《Day 1 の投与速度》

[サークリサ 800mg / 日以下の時]

55mL/hr(1 時間)→70mL/hr(30 分)→85mL/hr(30 分)→以降は 100mL/hr で最後まで

[サークリサ 801~1200mg / 日の時]

35mL/hr(1 時間)→45mL/hr(30 分)→55mL/hr(30 分)→65mL/hr(30 分)→75mL/hr(30 分)→
以降は 80mL/hr で最後まで

[サークリサ 1201~1600mg / 日の時]

25mL/hr(1 時間)→35mL/hr(30 分)→40mL/hr(30 分)→50mL/hr(30 分)→55mL/hr(30 分)→
以降は 60mL/hr で最後まで

《Day 8・15・22 の投与速度》

[サークリサ 800mg / 日以下の時]

55mL/hr(1 時間)→85mL/hr(30 分)→115mL/hr(30 分)→以降は 125mL/hr で最後まで

[サークリサ 801~1200mg / 日の時]

35mL/hr(1 時間)→55mL/hr(30 分)→75mL/hr(30 分)→以降は 80mL/hr で最後まで

[サークリサ 1201~1600mg / 日の時]

25mL/hr(1 時間)→40mL/hr(30 分)→55mL/hr(30 分)→以降は 60mL/hr で最後まで

点滴静注 Isa+d 療法レジメン（2サイクル目以降）

| 1 サイクル 28日間 | 第1週目 | | | | | | | 第2週目 | | | | | | | 第3週目 | | | | | | | 第4週目 | | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ISA | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| DEX | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | |

【投与方法】

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|--|
| Day 1・15 | 1 | ルート用 生食 100mL | 点滴静注 | ルート確保用 最後に全開で滴下 |
| | 2 | 生食 100mL ポラミン注 5mg 1管 ファモチジン注 20mg 1管 デキサート注 6.6mg <u>6管(75歳以上は3管↑)</u> | 点滴静注 | 1の側管から投与 15分で滴下 (Infusion reactionの予防) ※デキサートは骨髄腫治療目的 |
| | 3 | アセリオ静注液 70mL <u>(30mL 抜く)</u> | 点滴静注 | <u>2の続き</u> で投与 15分で滴下 (Infusion reactionの予防) |
| | 4 | 生食 100mL | 点滴静注 | <u>3の続き</u> で投与 15分で滴下 |
| | 5 | <u>フィルター使用</u> 生食 250mL <u>(※総量 250mL になるように抜く)</u> サークリサ _____ mg | 点滴静注 (輸液ポンプ) | Infusion reaction 注意 滴下速度注意。 (詳細は下記速度指示参照) |
| <p>[サークリサ 800mg/日以下の時] 55mL/hr(1時間)→85mL/hr(30分)→115mL/hr(30分)→以降は 125mL/hr で最後まで</p> <p>[サークリサ 801~1200mg/日の時] 35mL/hr(1時間)→55mL/hr(30分)→75mL/hr(30分)→以降は 80mL/hr で最後まで</p> <p>[サークリサ 1201~1600mg/日の時] 25mL/hr(1時間)→40mL/hr(30分)→55mL/hr(30分)→以降は 60mL/hr で最後まで</p> | | | | |