

KRd療法レジメン

1～12 サイクル

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Carfilzomib	●	●						●	●						●	●												
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
DEX	●							●							●							●						

13 サイクル以降

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Carfilzomib	●	●													●	●												
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
DEX	●							●							●							●						

【投与量】

一般名（略語）	投与量	備考欄
カルフィルゾミブ（CAR）	27mg/m ² ※MAX59.4mg/body まで (1 サイクル目の Day1・2のみ 20mg/m ² ※MAX44mg/body まで)	Irritant drug
レナリドミド（LEN）	25mg/body (Day1～21)	※適宜減量される場合あり
デキサメタゾン（DEX）	40mg/body	※適宜減量される場合あり

【投与方法】

1	生食 500mL	点滴静注	腫瘍崩壊症候群予防の hydration：2 時間で滴下
2	ルート用 5%ブドウ糖液 500mL	点滴静注	CAR の 投与終了後は 2 時間で滴下
3	グラニセトロン（3mg） 100mL デキサメタゾン 3.3mg	点滴静注	2 の側管から投与 30 分で滴下
4	<u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 50mL (※50mL 抜く) カルフィルゾミブ 20 or 27mg/m ²	点滴静注	Infusion reaction 注意 10 分で滴下