

Kd療法レジメン：週2回投与法

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Carfilzomib	●	●						●	●						●	●												
DEX	●	●						●	●						●	●						●	●					

【投与量】

一般名（略語）	投与量
カルフィルゾミブ（CAR）	56mg/m ² ※MAX123.2mg/body まで （1 サイクル目の Day1・2 のみ 20mg/m ² ※MAX44mg/body まで）
デキサメタゾン（DEX）	20mg/Body ※適宜減量される場合あり

【投与方法】

1	生食 500mL	点滴静注	腫瘍崩壊症候群予防の hydration
2	ルート用 5%ブドウ糖液 500mL	点滴静注	CAR の 投与終了後は 1～2 時間で滴下
3	レナデックス錠（4mg） 5 錠 ※適宜減量される場合あり	内服	CAR 投与開始する 4 時間～30 分前までに内服
4	<u>フィルター使用</u> 5%ブドウ糖注 50mL（※50mL 抜く） カルフィルゾミブ _____mg	点滴静注	Infusion reaction 注意 30 分で滴下 （Irritant drug）

Kd療法レジメン：週1回投与法

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Carfilzomib	●							●							●													
DEX	●							●							●							●						

【投与量】

一般名（略語）	投与量
カルフィルゾミブ（CAR）	70mg/m ² ※MAX154mg/body まで （1 サイクル目の Day1 のみ 20mg/m ² ※MAX44mg/body まで）
デキサメタゾン（DEX）	40mg/Body ※適宜減量される場合あり

【投与方法】

1	生食 500mL	点滴静注	腫瘍崩壊症候群予防のhydration
2	ルート用 5%ブドウ糖液 500mL	点滴静注	CAR の投与終了後は 1～2 時間で滴下
3	レナデックス錠（4mg） 5 錠 ※適宜減量される場合あり	内服	CAR 投与開始する 4 時間～30 分前までに内服
4	フィルター使用 5%ブドウ糖注 50mL（※50mL 抜く） カルフィルゾミブ _____mg	点滴静注	Infusion reaction 注意 30 分で滴下 （Irritant drug）