

# MPV 療法レジメン

## 【cycle 1～4】

|       | 1 週目 |   |   |   |   |   |   | 2 週目 |   |    |    |   |    |    | 3 週目 |    |    | 4 週目 |    |    |   |    |    |    | 5 週目 |    |   |    |    |   |    | 6 週目 |  |  |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|---|----|----|------|----|----|------|----|----|---|----|----|----|------|----|---|----|----|---|----|------|--|--|
|       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | ~ | 14 | 15 | ~    | 21 | 22 | 23   | 24 | 25 | ~ | 28 | 29 | 30 | 31   | 32 | ~ | 35 | 36 | ~ | 42 |      |  |  |
| L-PAM | ●    | ● | ● | ● |   |   |   |      |   |    |    |   |    |    |      |    |    |      |    |    |   |    |    |    |      |    |   |    |    |   |    |      |  |  |
| PSL   | ●    | ● | ● | ● |   |   |   |      |   |    |    |   |    |    |      |    |    |      |    |    |   |    |    |    |      |    |   |    |    |   |    |      |  |  |
| BOR   | ●    |   |   | ● |   |   |   | ●    |   |    | ●  |   |    |    |      |    | ●  |      |    | ●  |   |    | ●  |    |      | ●  |   |    |    |   |    |      |  |  |

- 最低 72 時間空けて投与する事

## 【cycle 5～9】

|       | 1 週目 |   |   |   |   |   |   | 2 週目 |   |   |    |    | 3 週目 |   |    |    | 4 週目 |   |    |    | 5 週目 |   |    |  |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|----|----|------|---|----|----|------|---|----|----|------|---|----|--|
|       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | ～ | 14 | 15 | 16   | ～ | 21 | 22 | 23   | ～ | 28 | 29 | 30   | ～ | 35 |  |
| L-PAM | ●    | ● | ● | ● |   |   |   |      |   |   |    |    |      |   |    |    |      |   |    |    |      |   |    |  |
| PSL   | ●    | ● | ● | ● |   |   |   |      |   |   |    |    |      |   |    |    |      |   |    |    |      |   |    |  |
| BOR   | ●    |   |   |   |   |   |   | ●    |   |   |    | ●  |      |   |    | ●  |      |   |    |    |      |   |    |  |

## 【投与量】

| 一般名（略語）       | 投与量                  | 投与日                                                           |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| メルファラン(L-PAM) | 9mg/m <sup>2</sup>   | Day 1～4                                                       |
| プレドニゾロン(PSL)  | 60mg/m <sup>2</sup>  | Day 1～4                                                       |
| ボルテゾミブ (BOR)  | 1.3mg/m <sup>2</sup> | Cycle 1～4) Day1,4,8,11,22,25,29,32<br>Cycle 5～9) Day1,8,15,22 |

## 【投与方法】

|   |              |                 |     |                              |
|---|--------------|-----------------|-----|------------------------------|
| 1 | 開始 :<br>終了 : | ボルテゾミブ _____ mg | 皮下注 | 3mg あたり 1.2mL で溶解 (2.5mg/mL) |
|---|--------------|-----------------|-----|------------------------------|