

## Pola+R-CHP 療法レジメン（1～6 サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pola	●																				
R	●																				
CPA	●																				
ADM	●																				
PSL	●	●	●	●	●																

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量	注意事項
ポラツズマブベドチン（Pola）	1.8mg/kg	Infusion reaction
リツキシマブ（R）	375mg/m <sup>2</sup>	Infusion reaction
シクロホスファミド（CPA）	750mg/m <sup>2</sup>	
ドキシソルピシン（ADM）	50mg/m <sup>2</sup>	Vesicant drug
プレドニゾン（PSL）	60mg/m <sup>2</sup>	

### 【投与方法】

1	投与 30 分前内服 アセトアミノフェン錠(500mg) 1T/d-カaffein(2mg) 1T/ラフチジン(10mg) 1T		
2	ルート用 生食 100mL	点滴静注	終了後、全開
3	生食 500mL リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	カルテ指示優先
	初回：25mL/h(1 時間)→50mL/h(1 時間) →100mL/h(1 時間)→200mL/h で最後まで 2回目以降：25mL/h(30 分)→50mL/h(30 分) →100mL/h(1 時間)→200mL/h で最後まで		
4	生食 100mL	点滴静注	30 分
5	<u>フィルター使用</u> 生食 100mL ポラツズマブベドチン 1.8mg/kg	点滴静注	初回：90 分 2 回目以降：30 分
6	生食 100mL	点滴静注	15 分
7	グラニセトロン(3mg) 100mL	点滴静注	15 分
8	生食 100mL ドキシソルピシン 50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15 分
9	生食 100mL シクロホスファミド 750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30 分

## Pola+R-CHP 療法レジメン（7、8 サイクル目）

※ 7、8 サイクル目はリツキシマブ単体です。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
R	●																				

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量	注意事項
リツキシマブ（R）	375mg/m <sup>2</sup>	Infusion reaction 悪寒、発熱、めまい、呼吸困難感など注意

### 【投与方法】

1	投与 30 分前内服 アセトアミノフェン錠(500mg) 1T/d-カルルエニシ(2mg) 1T/ラフチジン(10mg) 1T		
2	ルート用 生食 100mL	点滴静注	終了後、全開
3	生食 500mL リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	カルテ指示優先
<small>初回：25mL/h(1 時間)→50mL/h(1 時間) →100mL/h(1 時間)→200mL/h で最後まで 2回目以降：25mL/h(30 分)→50mL/h(30 分) →100mL/h(1 時間)→200mL/h で最後まで</small>			