

R-CHOP 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
R	●																				
CPA		●																			
ADM		●																			
VCR		●																			
PSL		●	●	●	●	●															

【投与量】

一般名（略語）	投与量
リツキシマブ（R）	375mg/m ²
シクロホスファミド（CPA）	750mg/m ²
ドキシソルビシン（ADM）	50mg/m ²
ビンクリスチン（VCR）	1.4mg/m ²
プレドニゾロン（PSL）	60mg/m ²

【投与方法】

Day1

	アセトアミノフェン(500mg) 1T d-ケルフェニラミン(2mg) 1T ラフチジン(10mg) 1T	投与 30 分前内服	
1	ルート用 生食 100mL	点滴 静注	
2	生食 500mL リツキシマブ 375mg/m ²	点滴 静注	カルテ指示優先
	初回：25mL/h(1時間)→50mL/h(1時間)→100mL/h(1時間)→200mL/hで最後まで 2回目以降：25mL/h(30分)→50mL/h(30分)→100mL/h(1時間)→200mL/hで最後まで		

Day2

1	ルート用 生食 250mL	点滴静注	
2	グラニセトロン（3mg） 100mL	点滴静注	30分
3	生食 100mL ドキシソルビシン 50mg/m ²	点滴静注	15分
4	生食 20mL ビンクリスチン 1.4mg/m ²	静注	ゆっくり1分程度
5	生食 100mL シクロホスファミド 750mg/m ²	点滴静注	30分