

R2療法レジメン：

1 サイクル

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
R	●							●							●						●							
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

2～5 サイクル

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
R	●																											
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

6～12 サイクル

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

【投与量】

一般名（略語）	投与量	注意事項
リツキシマブ（R）	375mg/m ²	Infusion reaction 悪寒、発熱、めまい、呼吸困難感など注意
レナリドミド（LEN）	※20mg/日	Day 1～2 1 に内服

【投与方法】

1	投与 30 分前内服確認 カロナール錠 500mg 1T d-クルカエニミシリン酸塩錠 2mg 1T プロテカジン OD 錠 10mg 1T		
2	ルート用 生食 100mL	点滴静注	終了後、全開で投与
3	生食 500mL リツキシマブ _____mg	点滴静注	下記のとおり（＊）

＊リツキシマブの点滴速度は問題なければ下記のように速度変更

初回：25mL/h(1 時間)→50mL/h(1 時間) →100mL/h(1 時間)→200mL/h で最後まで

2回目以降：25mL/h(30 分)→50mL/h(30 分) →100mL/h(1 時間)→200mL/h で最後まで