

VRD 療法レジメン

週 2 回：皮下投与

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BOR	●			●				●			●										
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
DEX	●	●		●	●			●	●		●	●									

週 1 回：皮下投与

週	1 週目							2 週目							3 週目							4 週目			5 週目						
日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24~35 日目							
BOR	●							●							●							●									
LEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
DEX	●	●						●	●						●	●						●	●								

【投与量】

一般名（略語）	投与量	注意事項
ボルテゾミブ（BOR）	1.3mg/m ²	3mg あたり 1.2mL で溶解（2.5mg/mL）
レナリドミド（LEN）	25mg/日	※適宜減量される可能性あり
デキサメタゾン（DEX）	20mg/日	※適宜減量される可能性あり （76 歳以上：Day2、5、9、12 は省略）

【投与方法】

1	カイトリル錠 1mg 1 錠（or 2 錠） レナデックス錠 4mg 5 錠	内服	ベルケイド投与開始の 30 分～1 時間前に内服
2	ボルテゾミブ _____mg	皮下注	

Day1～14 まで連日内服するもの

●レブラミドカプセル（5mg） 5カプセル 1 日 1 回 内服

（高脂肪食の影響を受けるため、空腹時内服を推奨）

※適宜減量される場合あり

《75 歳以下の患者の場合》

ベルケイド投与の翌日（Day2、5、9、12）にも、

●レナデックス錠（4mg） 5錠/日 1 日 1 回 内服

※適宜減量される場合あり