

PER/3wTr/PTX 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PER	●																				
Tr	●																				
PTX	●							●							●						

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ペルツズマブ（PER）	初回：840mg、2回目以降：420mg
トラスツズマブ（Tr）	初回：8mg/kg、2回目以降：6mg/kg
パクリタキセル（PTX）	80mg/m ²

【投与方法】

Day 1

1	生食 250mL	点滴静注	
2	生食 250mL ペルツズマブ 420 または 840mg	点滴静注	初回：60分 2回目以降：30分
3	生食 250mL トラスツズマブ 6 または 8mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目以降：30分以上
	レスタミン 5T	内服	
4	生食 50mL ファモチジン(20mg) 1A デキサメタゾン 1.65 ~8.25mg	点滴静注	5分
30分あける			
5	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分

Day 8, 15

	レスタミン 5T	内服	
1	生食 100mL	点滴静注	
2	生食 50mL ファモチジン(20mg) 1A デキサメタゾン 1.65 ~8.25mg	点滴静注	5分
30分あける			
3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分