

R-B 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
R	●																											
B		●	●																									

【投与量】

一般名（略語）	投与量	投与日
リツキシマブ (R)	375mg/m ²	Day 1
ベンダムスチン (B)	90mg/m ²	Day 2, 3

【投与方法】

Day 1

	アセトアミノフェン (500mg) 1T d-カルフェニラミン (2mg) 1T ラフチジン (10mg) 1T	投与 30 分前内服	
1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 500mL リツキシマブ 375mg/m ²	点滴静注	下記のとおり

リツキシマブの点滴速度は問題なければ下記のように速度変更

初回：25mL/h(1時間)→50mL/h(1時間)→100mL/h(1時間)→200mL/hで最後まで

2回目以降：25mL/h(30分)→50mL/h(30分)→100mL/h(1時間)→200mL/hで最後まで

Day 2, 3

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	グラニセトロン 100mL デキサート 6.6mg	点滴静注	30分
3	生食 250mL トリアキシン 90mg/m ²	点滴静注	1時間