

R-THPCOP 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
R	●																				
CPA		●																			
THP		●																			
VCR		●																			
PSL		●	●	●	●	●															

【投与量】

一般名（略語）	投与量
リツキシマブ（R）	375mg/m ²
シクロホスファミド（CPA）	750mg/m ²
ピラルビシン（THP）	50mg/m ²
ビンクリスチン（VCR）	1.4mg/m ²
プレドニゾロン（PSL）	60mg/m ²

【投与方法】

Day 1

1	アセトアミノフェン（500mg）1T / d-クロルフェニラミン 1T / プロテカジン 1T		30分前内服
2	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
3	生食 500mL リツキシマブ 375mg/m ²	点滴静注	下記のとおり

リツキシマブの点滴速度は問題なければ下記のように速度変更
 初回：25mL/h(1時間)→50mL/h(1時間)→100mL/h(1時間)→200mL/hで最後まで
 2回目以降：25mL/h(30分)→50mL/h(30分)→100mL/h(1時間)→200mL/hで最後まで

Day 2

1	ルート用 生食 250mL	点滴静注	終了後、全開
2	グラニセトロン 100mL	点滴静注	30分
3	生食 50mL ピラルビシン 50mg/m ²	点滴静注	15分
4	生食 20mL ビンクリスチン 1.4mg/m ²	静注	ゆっくり 1分程度
5	生食 100mL シクロフォスファミド 750mg/m ²	点滴静注	30分