

## Pembro (200) /GEM/CBDCA 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembro	●																				
GEM	●							●													
CBDCA	●							●													

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
ペムブロリズマブ（Pembro）	200mg
ゲムシタビン（GEM）	1,000mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン（CBDCA）	AUC 2

### 【投与方法】

Day 1	1	生食 250mL	点滴静注	ルート
	2	生食 100mL ペムブロリズマブ 200mg	点滴静注	30分
	3	生食 50mL	点滴静注	
	4	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
	5	生食 100mL ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
	6	生食 250mL カルボプラチン AUC 2	点滴静注	90分
Day 8	1	生食 250mL	点滴静注	ルート
	2	グラニセトロン 100mL デキサート 9.9mg	点滴静注	30分
	3	生食 100mL ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
	4	生食 250mL カルボプラチン AUC 2	点滴静注	90分