

## 子宮頸がん Pembro/TC (AUC5) +BV 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pembro	●																					
PTX	●																					
CBDCA	●																					
BV	●																					

一般名 (略語)	用量
ペムブロリズマブ (Pembro)	200mg
カルボプラチン (CBDCA)	AUC 5 (Jelliffe の式)
パクリタキセル (PTX)	175mg/m <sup>2</sup>
ベバシズマブ (BV)	15mg/kg

### 【投与方法】

1	ルート 生食 100mL	点滴静注	終了後全開
2	生食 100mL ペムブロリズマブ 200mg	点滴静注	30分
3	生食 50mL	点滴静注	
	ジフェンヒドラミン (10) 5T	内服	
4	生食 250mL ホスアプレピタント 1V	点滴静注	30分
5	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 19.8mg ファモチジン 1A	点滴静注	30分
6	生食 500mL パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間
7	生食 500mL パラプラチン AUC5	点滴静注	90分
8	生食 100mL ベバシズマブ 15mg/kg	点滴静注	1回目：90分 2回目：60分 3回目以降：30分