

PLD/BV 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PLD	●																												
BV	●																												

一般名（略語）	用量
塩酸ドキソルビシン（PLD）	40mg/m ²
ベバシズマブ（BV）	15mg/kg

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	<i>PLD とは混ぜない</i>
2	生食 100mL ベバシズマブ 15mg/kg	点滴静注	1回目：90分 2回目：60分 以降：30分
3	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30分
4	5%TZ 20mL	静注	
5	5%TZ 250mL PLD 40mg/m ²	点滴静注	2時間
6	5%TZ 100mL	点滴静注	フラッシュ用

PLD/BV (2w) 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PLD	●																												
BV	●														●														

一般名 (略語)	用量
塩酸ドキソルビシン (PLD)	40mg/m ²
ベバシズマブ (BV)	10mg/kg

【投与方法】

Day1	1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	<i>PLD とは混ぜない</i>
	2	生食 100mL ベバシズマブ 10mg/kg	点滴静注	1 回目 : 90 分 2 回目 : 60 分 以降 : 30 分
	3	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30 分
	4	5%TZ 20mL	静注	
	5	5%TZ 250mL PLD 40mg/m ²	点滴静注	2 時間
	6	5%TZ 100mL	点滴静注	フラッシュ用
Day15	1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
	2	生食 100mL ベバシズマブ 10mg/kg	点滴静注	1 回目 : 90 分 2 回目 : 60 分 以降 : 30 分