

## G-CVP 療法レジメン（1サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
G		●							●							●					
CPA	●																				
VCR	●																				
PSL	●	●	●	●	●																

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
オビヌツズマブ（G）	1000mg/Body
シクロホスファミド（CPA）	750mg/m <sup>2</sup>
ビンクリスチン（VCR）	1.4mg/m <sup>2</sup>
プレドニゾロン（PSL）	60mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

Day1			
1	生食 100mL	点滴静注	
2	グラニセトロン 100mL	点滴静注	30分
3	生食 20mL ビンクリスチン 1.4mg/m <sup>2</sup>	静注	ゆっくり1分程度
4	生食 100mL シクロホスファミド 750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
プレドニゾロン Day 1 朝から内服			
Day2			
	アセトアミノフェン(500) 1T, d-ケルフェエラミン(2) 1T, ラフチジン (10) 1T	内服	
1	生食 100mL	点滴静注	
2	生食 200mL オビヌツズマブ 1000mg	点滴静注	指示通り
Day9, 16			
	アセトアミノフェン(500) 1T, d-ケルフェエラミン(2) 1T, ラフチジン (10) 1T	内服	
1	生食 100mL	点滴静注	
2	生食 50mL デキサート 6.6mg	点滴静注	
3	生食 200mL オビヌツズマブ 1000mg	点滴静注	指示通り

## G-CVP 療法レジメン (2~8サイクル目)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
G		●																			
CPA	●																				
VCR	●																				
PSL	●	●	●	●	●																

### 【投与量】

一般名 (略語)	投与量
オビヌツズマブ (G)	1000mg/Body
シクロホスファミド (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>
ビンクリスチン (VCR)	1.4mg/m <sup>2</sup>
プレドニゾロン (PSL)	60mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

Day1			
1	生食 100mL	点滴静注	終了後、全開で投与
2	グラニセトロン 100mL	点滴静注	30分
3	生食 20mL ビンクリスチン 1.4mg/m <sup>2</sup>	静注	ゆっくり1分程度
4	生食 100mL シクロホスファミド 750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
プレドニゾロン Day 1 朝から内服			
Day2			
アセトアミノフェン(500) 1T, d-ケルフェニン(2) 1T, ラフチジン (10) 1T		内服	
1	生食 100mL	点滴静注	
2	生食 200mL オビヌツズマブ 1000mg	点滴静注	指示通り