

ABVD 療法レジメン

	1	2	3	…	13	14	15	16	17	…	26	27	28
ADM	●						●						
BLM	●						●						
VLB	●						●						
DTIC	●						●						

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ドキシソルビシン（ADM）	25mg/m ²
ブレオマイシン（BLM）	10mg/m ²
ビンブラスチン（VLB）	6mg/m ²
ダカルバジン（DTIC）	375mg/m ²

【投与方法】

1	生食 250mL	点滴静注	
2	生食 100mL ホスアプレピタント 1V	点滴静注	30 分
3	パロノセトロン 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30 分
4	生食 50mL ビンブラスチン 6mg/m ²	点滴静注	15 分
5	生食 100mL ドキシソルビシン 25mg/m ²	点滴静注	30 分
6	生食 100mL ブレオ 10mg/m ²	点滴静注	30 分
7	生食 250m L ダカルバジン 375mg/m ²	点滴静注	1 時間

ABVd 療法レジメン

	1	2	3	...	13	14	15	16	17	...	26	27	28
ADM	●						●						
BLM	●						●						
VLB	●						●						
DTIC	●						●						

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ドキシソルビシン（ADM）	25mg/m ²
ブレオマイシン（BLM）	9mg/m ²
ビンブラスチン（VLB）	6mg/m ²
ダカルバジン（DTIC）	250mg/m ²

【投与方法】

1	生食 250mL	点滴静注	全開
2	生食 100mL ホスアプレピタント 1V	点滴静注	30分
3	パロノセトロン 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
4	生食 50mL ビンブラスチン 6mg/m ²	点滴静注	15分
5	生食 100mL ドキシソルビシン 25mg/m ²	点滴静注	30分
6	生食 100mL ブレオ 9mg/m ²	点滴静注	30分
7	生食 250m L ダカルバジン 250mg/m ²	点滴静注	1時間